

ACC® 100 100 mg

Pulbere pentru soluție orală
Acetylcysteinum

Hexal AG,
Industriestrasse 25,
D-83607
Holzkirchen, Germania



SANDOZ
a Novartis company

ACC® 100 100 mg

Pulbere pentru soluție orală

Acetylcysteinum



20 picături a **3 g**

MD049

ACC® 100

A se citi prospectul înainte de utilizare.

1 pic conține:
substanța activă: acetilcisteină
100 mg;
excipienți: sucroză, acid ascorbic, zaharină, aromă de portocale.

Administrare orală.
A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!
Fără prescripție medicală.

108 x 42 x 85

SPECIFICATION DATE:	11
PRODUCT NAME:	ACC 100MG
IDENTIFICATION CODE:	MIR-FON- SZPL- VERSION:
MD049	7pt
DIMENSIONS:	DATE:
105x42x85mm	05.10.2015
MARKS USED:	
Pantone 541 C	
Pantone Reflex Blue C	



ACC® 100 100 mg

Pulbere pentru soluție orală

Acetylcysteinum



20 picături a **3 g**



SANDOZ
a Novartis company

ACC® 100

Doze și mod de administrare:
Copii cu vârsta de 2-6 ani: 1 pic ACC® 100 de 2-3 ori pe zi.
Copii cu vârsta de 6-14 ani: 1 pic ACC® 100 de 3 ori pe zi sau 2 picături ACC® 100 de 2 ori pe zi.
Adulți și copii cu vârsta peste 14 ani: 2 picături ACC® 100 de 2-3 ori pe zi.
ACC® 100 pulbere pentru soluție orală se administrează după mese. Conținutul unui pic se dizolvă într-un pahar cu apă, suc sau ceai rece.



4 030855 506156

ACC® 100 100 mg

Pulbere pentru soluție orală
Acetylcysteinum

Lot:

Data expirării: