

**Prospect: Informații pentru utilizator****Chondro-Ritz 200 mg+250 mg capsule**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Chondro-Ritz și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Chondro-Ritz
3. Cum să luați Chondro-Ritz
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Chondro-Ritz
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE Chondro-Ritz ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

Acest medicament conține sulfat de condroitină și sulfat de glucozamină.

Chondro-Ritz reduce inflamația, durerea în repaus și la mișcare, scade necesitatea în medicamente antiinflamatoare. Stimulează regenerarea țesutului cartilajinos.

La administrarea sistematică medicamentul încetinește progresarea proceselor degenerative în articulații și coloana vertebrală.

Chondro-Ritz se utilizează în:

- tratamentul și profilaxia maladiilor degenerativ-distrofice ale articulațiilor și coloanei vertebrale;
- osteoartrită primară și secundară (osteoartroze);
- osteoartrite cu diversă localizare (ale articulației genunchiului, coxo-femorale, radio-carpiană, a coloanei vertebrale etc.);
- periartrită scapulo-humerală;
- osteocondroză;
- spondiloză;
- osteoporoză, parodontopatie;
- fracturi osoase (pentru accelerarea formării calusului osos).

**2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ LUAȚI Chondro-Ritz****Nu luați Chondro-Ritz în cazul:**

- dacă aveți alergie (hipersensibilitate) la componentele acestui medicament;
- dacă aveți probleme grave cu rinichii.

-

**Atenționări și precauții**

Medicamentul se va administra cu precauți în caz de sângerări sau predispoziție la sângerări, astm bronșic, diabet zaharat.

### **Copii:**

Eficacitatea și siguranța administrării medicamentului la copii cu vârsta sub 12 ani nu a fost stabilită.

### **Chondro-Ritz împreună cu alte medicamente**

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente, inclusiv medicamente eliberate fără prescripție medicală.

La administrare combinată glucozamina intensifică absorbția din tractul gastrointestinal a tetraciclinelor și diminuează absorbția penicilinelor și a cloramfenicolului.

### **Chondro-Ritz împreună cu alimente, băuturi și alcool**

Chondro-Ritz se administrează până la mese.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Siguranța și eficacitatea administrării medicamentului în sarcină și perioada de alăptare nu sunt determinate.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Administrarea de Chondro-Ritz nu influențează asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

## **3. CUM SĂ LUAȚI Chondro-Ritz**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Administrare orală.

Adulților și copiilor cu vârsta peste 12 ani doza inițială constituie câte 6 capsule pe zi primele 3 săptămâni, ulterior tratamentul se prelungește cu doza de câte 4 capsule pe zi.

Efectul terapeutic stabil se atinge la administrarea medicamentului nu mai puțin de 6 luni.

Capsulele se administrează până la mese.

### **Dacă luați mai mult Chondro-Ritz decât trebuie**

Dacă ați luat mai multe capsule decăt v-au fost prescrise, contactați imediat medicul sau farmacistul.

### **Dacă uitați să luați Chondro-Ritz**

Dacă ați uitat să luați o doză, luați-o imediat ce vă aduceți aminte. Dacă se apropie momentul următoarei doze, nu luați o doză dublă, ci continuați să administrați medicamentul după cum e recomandat, respectând intervalele obișnuite între prize.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, Chondro-Ritz poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Au fost raportate următoarele reacții adverse:

*Mai puțin frecvente* (care afectează mai puțin de 1 din 100 pacienți):  
epigastralgie, greață, meteorism, diaree sau constipații.

*Rare* (care afectează mai puțin de 1 din 1000 pacienți):

Reacții alergice.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acesta permite monitorizarea în continuare a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacții adverse suspectate, prin intermediul sistemului național de raportare disponibil pe site-ul oficial al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale la următoarea adresă web: [www.amed.md](http://www.amed.md).

#### **5. CUM SE PĂSTREAZĂ Chondro-Ritz**

A se păstra la loc uscat, ferit de lumină, la temperatura sub 25 °C.

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după EXP.

Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați nici un medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

##### **Ce conține Chondro-Ritz**

1 capsulă conține:

*substanțe active:* sulfat de condroitină – 200 mg, sulfat de glucozamină – 250 mg.

*Excipienți:* Stearat de magneziu

*Compoziția capsulei:* indigotină – FD&Blue2, dioxid de titan, oxid galben de fier, gelatină.

##### **Cum arată Chondro-Ritz și conținutul ambalajului**

Capsule gelatinoase tari cu capacul și corpul de culoare verde deschis, nr. 0.

Conținutul capsulei: pulbere de culoare albă cu nuanță crem.

##### **Conținutul ambalajului**

Câte 10 capsule în blister (PVC/Al).

Câte 5 blistere în cutie de carton.

##### **Deținătorul certificatului de înregistrare și fabricantul**

GM Pharmaceuticals Ltd.,

Phonichala 65, Tbilisi, 0165, Georgia.

Tel.: +995 32 2404801/02; fax: +995 32 2404803

**Acest prospect a fost revizuit în Iulie 2015.**