

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
INSTRUCȚIUNE PENTRU ADMINISTRARE

GASTRICUMEEL®
comprimate sublinguale

DENUMIREA COMERCIALĂ

Gastricumeel®

COMPOZIȚIA

1 comprimat conține:

substanțe active:

Acidum arsenicosum D6 30,0 mg,

Argentum nitricum D6 30,0 mg,

Carbo vegetabilis D6 60,0 mg,

Pulsatilla pratensis D4 60,0 mg,

Stibium sulfuratum nigrum D6 60,0 mg,

Strychnos nux-vomica D4 60,0 mg;

excipienți: stearat de magneziu, lactoză monohidrat.

FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate sublinguale.

DESCRIEREA MEDICAMENTULUI

Comprimate rotunde cu fațete, de culoare de la alb până la galben-pal, fără miros.

GRUPA FARMACOTERAPEUTICĂ

Medicament homeopat.

PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE

Preparatul manifestă acțiune antiinflamatoare, sedativă, antispastică, hemostatică și hepatoprotectoare.

INDICAȚII TERAPEUTICE

Gastrite acute și cronice cu sau fără hiperaciditate, dereglări funcționale ale tractului gastrointestinal (pirozis, flatulență, sindrom gastrocardial).

DOZE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Doza pentru o priză: adulți și copii cu vârsta peste 6 ani – 1 comprimat de 3 ori de zi, sublingual, cu 15-20 min. până la masă sau peste o oră după luarea meselor. În cazuri acute se va administra câte 1 comprimat la fiecare 15 min. pe durata primelor 2 ore.

REAȚII ADVERSE

Nu sunt cunoscute.

În caz de apariție a oricăror manifestări neobișnuite este necesar de a consulta medicul.

CONTRAINDICAȚII

Hipersensibilitate la componentele preparatului.

SUPRADOZAJ

Nu sunt relatate cazuri de supradozaj.

ATENȚIONĂRI ȘI PRECAUȚII SPECIALE DE UTILIZARE

Acest produs medicamentos conține lactoză. Pacienții cu tulburări ereditare rare de tipul intoleranței la galactoză, deficiența de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbție la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Administrarea în sarcină și perioada de alăptare

Nu este contraindicat.

Influența asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu are influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

INTERACȚIUNI CU ALTE MEDICAMENTE, ALTE TIPURI DE INTERACȚIUNI

Produsul medicamentos este compatibil cu alte medicamente.

PREZENTARE, AMBALAJ

Comprimate sublinguale. Câte 50 comprimate în flacon de masă plastică. Câte 1 flacon împreună cu instrucțiunea pentru administrare se plasează în cutie de carton.

PĂSTRARE

A se păstra la loc uscat, la temperaturi sub 25 °C.

A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor!

TERMEN DE VALABILITATE

5 ani.

A nu se utiliza după data de expirare indicată pe ambalaj.

STATUTUL LEGAL

Fără prescripție medicală.

DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Octombrie 2014

DEȚINĂTORUL CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germania

NUMELE ȘI ADRESA PRODUCĂTORULUI

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germania

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

La apariția oricărei reacții adverse informați secția de farmacovigilență a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (tel.: 0 22 88 43 38)