

Prospect: Informații pentru utilizator

**ACARILBIAL 277 mg/ml soluție cutanată
Benzil benzoat**

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Cu toate acestea, trebuie să utilizați ACARILBIAL cu atenție pentru a obține cel mai bun rezultat.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Trebuie să vă prezentați la medic dacă simptomele dumneavoastră se înrăutățesc sau nu se îmbunătățesc.
- Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să informați medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este ACARILBIAL și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați ACARILBIAL
3. Cum să luați ACARILBIAL
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează ACARILBIAL
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este ACARILBIAL și pentru ce se utilizează

ACARILBIAL este un preparat antiparazitar pentru administrare locală, pe piele, utilizat pentru tratamentul scabiei.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați ACARILBIAL

Nu utilizați ACARILBIAL:

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la benzil benzoat sau la oricare dintre celelalte componente ale ACARILBIAL;
- pe pielea inflamată acut (pielea roșie, cu arsură sau senzație dureroasă);
- pe pielea lezată.

Atenționări și precauții

Evitați contactul cu fața, ochii, mucoasele și meatul uretral. În caz de infecții, leziuni ale pielii (manifestate prin febră, puroi, durere sau înroșire locală), ar putea fi necesar să se folosească un antibiotic, și, prin urmare, ar trebui să fie consultat medicul.

Trebuie utilizat cu precauție la copiii cu vârsta mai mică de 10 de ani.

ACARILBIAL împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați sau ați utilizat recent orice alte medicamente, inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală.

Interacțiune este influența unui medicament care poate avea loc asupra activității altor medicamente sau pe rezultatele testelor de laborator.

Deoarece ACARILBIAL este un medicament pentru uz cutanat și cu absorbție scăzută, nu are interacțiuni cunoscute cu medicamentele administrate pe alte căi.

Sarcina și alăptarea

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua orice medicament.

Efectele particulare ale ACARILBIAL în astfel de situații sunt necunoscute.

Nu există studii cu privire la utilizarea de benzil benzoat în timpul sarcinii și alăptării și, prin urmare, utilizarea ACARILBIAL trebuie să fie făcută cu prudență, raportul risc-beneficiu trebuie luat în considerare și acest medicament va fi utilizat numai în bază de prescripție medicală.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

3. Cum să luați ACARILBIAL

Folosiți întotdeauna ACARILBIAL exact așa cum va indicat medicul dumneavoastră. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

ACARILBIAL este destinat numai pentru uz cutanat.

Cu excepția cazului în care medicul a indicat altfel, ACARILBIAL trebuie utilizat după cum urmează:

Tratament de scabiei

1. Face-ți o baie fierbinte de aproximativ 10 minute, de preferință într-o cadă, și apoi stergeți-vă corespunzător cu un prosop uscat.
2. Aplicați pentru câteva minute, fricționând ușor pe toate suprafețele de piele (cu excepția pielii feței, ochilor, mucoaselor și meatului uretral), cu vată îmbibată în soluție și lasați să se usuce;
3. Repetați aplicarea din nou, lasați să se usuce și îmbrăcați hainele;
4. Peste 24-48 ore, se va face baie se va schimba îmbrăcămintea de corp și lenjeria de pat.

Deși, în unele cazuri, o singură aplicare este suficient pentru a obține vindecarea, experiența arată că, uneori, se recomandă ca acest tratament să fie repetat timp de 2 zile succesive și apoi se repetă după un interval de 7-10 zile. La adulți și copii volumul soluției la o aplicare nu trebuie să depășească 30 sau 20 ml, respectiv. În afară de pacient, partenerii sexuali și în special persoanele care locuiesc în aceeași locuință, trebuie să fie tratate în același timp. Orice îmbrăcăminte, care este în contact strâns cu pielea, mai ales lenjeria de pat și prosoapele, trebuie să fie spălate cu apă fierbinte.

Dacă luați mai mult ACARILBIAL decât trebuie

Este puțin probabil să apară efecte secundare în cazul în care doza și recomandările din acest prospect sunt respectate.

Utilizarea unei doze excesive poate provoca iritarea pielii. Dacă este cazul, se spală cu săpun și multă apă.

În cazul ingestiei accidentale sau voluntare, pot apărea convulsii, spasme musculare, necoordonare și dificultăți de urinare. Este posibil să apară pierderea cunoștinței. Este o situație foarte gravă, și ar trebui să fie oferit sprijin clinic și de specialitate. Dacă aveți îndoieli cu privire la utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca și toate medicamentele, ACARILBIAL poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacțiile adverse sunt acele efecte nedorite, care pot apărea la utilizarea sau aplicarea unui anumit medicament.

La dozele recomandate, ACARILBIAL este, de obicei, bine tolerat. Iritația locală ușoară (în special a organelor genitale de sex masculin), senzația de arsură, mâncărime sau sensibilitate alergică a pielii poate să apară. Prin urmare, trebuie evitat contact cu pielea feței, ochilor, mucoasele și meatul uretral.

Aplicarea repetată poate cauza inflamarea pielii (dermatită de contact). La vârstnici s-a observat mai frecvent uscăciunea pielii și semne de iritare cutanată.

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă, sau dacă observați orice reacție adversă nemenționată în acest prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului.

5. Cum se păstrează ACARILBIAL

A se păstra la temperaturi sub 30 °C. Flaconul se păstrează bine închis, în cutie, pentru a fi protejat de lumină și umiditate. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Nu utilizați ACARILBIAL după data de expirare care este înscrisă pe cutie sau pe flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu utilizați ACARILBIAL dacă observați semne vizibile de deteriorare.

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei reziduale sau menajere. Întrebați farmacistul cum să eliminați medicamentele care nu vă mai sunt necesare. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține ACARILBIAL

Substanța activă este benzil benzoatul. Un mililitru de soluție cutanată conține 277 mg de benzil benzoat. Celelalte componente sunt: glicerol, eugenol, alcool, ulei de rozmarin, ulei de trandafir și ulei de lavăntică.

Cum arată ACARILBIAL și conținutul ambalajului

ACARILBIAL este disponibil sub formă de soluție cutanată, a câte 200 ml în flacoane.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

BIAL-Portela & C^a, S.A.

À Av. da Siderurgia Nacional

4745-457 S. Mamede do Coronado

Portugalia

Atenționări

Pentru uz extern.

Acest prospect a fost revizuit în: ianuarie 2015